

Revisión


Calidad de vida en personas portadoras de una ostomía digestiva

Quality of life in people carrying a digestive ostomy

Qualidade de vida nas pessoas portadoras de estomas digestivas

*Claudia Liliana Valencia-Rico**
*Luz Adriana López-González***
*Laura Melissa Gómez-Suarez****
*Daniela Orrego-Murillo*****
*Laura Vanessa Restrepo-Peláez******

Autor de correspondencia

*  Enfermera. Especialista en Rehabilitación Cardiopulmonar. Magister en Enfermería con Énfasis en Cuidado al Adulto y Anciano. Profesora Programa Enfermería Universidad Católica de Manizales. Correo: cvalencia@ucm.edu.co Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-8348-5303>

** Enfermera. Especialista en Pedagogía para Docencia Universitaria. Especialista en Gerencia de la Calidad y Auditoría en Salud. Profesora Programa Enfermería Universidad Libre Pereira. Correo: luza.lopezg@unilibre.edu.co Orcid: <http://orcid.org/0000-0002-5067-9918>

*** Estudiante VIII Semestre. Programa Enfermería. Universidad Libre Pereira. Correo: laura.melisa1@hotmail.com

**** Estudiante VIII Semestre. Programa Enfermería. Universidad Libre Pereira. Correo: daniela.orrego1996@gmail.com

***** Estudiante VIII Semestre. Programa Enfermería. Universidad Libre Pereira. Correo: laurapelaez_69@hotmail.com


Resumen

Introducción: Las personas ostomizadas experimentan problemáticas clínicas, personales, familiares y sociales que repercuten en su calidad de vida. **Objetivo:** Realizar una revisión bibliométrica y exploratoria relacionada con la calidad de vida en personas portadoras de ostomías digestivas. **Metodología:** Se realizó búsqueda en Scopus, utilizando los descriptores: “Quality of life” y “Surgical stomas”. Se seleccionaron artículos publicados a partir del año 2014, en cualquier idioma, derivados de investigación y revisiones, escritos por enfermería exclusivamente o en cooperación con otras áreas de salud; se excluyeron las publicaciones de ostomías urológicas y respiratorias. **Resultados:** La muestra total fue de 39 manuscritos. El año de mayor publicación fue 2016; el 66,7 % de las investigaciones correspondía a nivel de evidencia baja y el 56,4 % correspondía a investigaciones descriptivas. A nivel exploratorio, el 31,4 % de los estudios utilizó cuestionarios relacionados con la calidad de vida, en el 14,2 % se indagó la calidad de vida a través de estudios cualitativos y en el 54,2 % se evaluaron otras temáticas que interfieren en la calidad de vida. **Conclusión:** La bibliometría muestra publicaciones con nivel de evidencia baja. Los resultados exploratorios muestran alteración del bienestar en la dimensión física primordialmente, generando situaciones de afrontamiento que afectan la calidad de vida.

Palabras Clave: Calidad de vida, Estomas quirúrgicas, Acontecimientos que cambian la vida, Enfermedades gastrointestinales.

Abstract

Introduction: Ostomate patients experiment clinical, personal, social, and family issues which have an impact in their quality of life. **Objective:** To perform a bibliometric and exploratory review related to the quality of life in people carrying digestive ostomies. **Methodology:** The descriptors “Quality of life” and “Surgical stomas” were used to perform a search in Scopus. Published papers from the year

Este es un artículo bajo la licencia CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) 

Recibido: 14 noviembre 2018 - Aprobado: 21 mayo de 2019

DOI: <https://doi.org/10.22463/17949831.1721>

Para citar este artículo/ To reference this article/ Para citar este artigo/

Osorio Contreras LV, Castiblanco López N. Significados en púerperas sobre la hospitalización en Unidad de Cuidados Intensivos. Rev. cienc. cuidad. 2019; 16(3):114-124

2014, derived from research and reviews written by nurses exclusively or in collaboration with other areas of health and published in different languages were chosen. The publications of urological and respiratory stomas were excluded. **Results:** There was a total sample of 39 manuscripts. The year of highest publications was 2016; the 66.7 % of the research corresponded to a level of low evidence and the 56.4 % corresponded to descriptive research. An exploratory level of 31.4 % of the studies used questionnaires related to the quality of life; in the 14.2 % the quality of life was inquired through qualitative studies, and in the 54.2 % other topics that interfere in the quality of life, were evaluated. **Conclusion:** The Bibliometrics shows publications with a low level of evidence. The exploratory results show mainly, an alteration of the well-being in the physical dimension, generating coping situations that affect the quality of life.

Keywords: Quality of life, Surgical Stomas, Life change events, Gastrointestinal Diseases.

Resumo

Introdução: As pessoas com estomas experimentam problemáticas clínicas, pessoais, familiares e sociais que repercutem na sua qualidade de vida. **Objetivo:** Realizar uma revisão bibliográfica exploratória relacionada com a qualidade de vida de pessoas portadoras de estomas digestivas. **Métodos:** Realizou-se a pesquisa no Scopus, utilizando os descritores: “Quality of life” e “Surgical stomas”. Selecionaram-se artigos publicados desde 2014 em qualquer língua, derivados de pesquisas e revisões, escritos por enfermagem exclusivamente ou em cooperação com outras áreas da saúde, excluíram-se artigos de estomas urológicas e respiratórias. **Resultados:** Obtiveram-se 39 artigos. O ano de maior publicação foi 2016, o 66,7% dos estudos tinha nível de evidência baixo e o 56,4% correspondeu a estudos descritivos. No nível exploratório, o 31,4% dos estudos empregou escalas relacionadas com qualidade de vida, o 14,2% indagou a qualidade de vida desenvolvendo pesquisas qualitativas e o 54,2% avaliaram outras temáticas que interferem na qualidade de vida. **Conclusão:** A literatura científica mostrou resultados com nível de evidencia baixo. Os resultados exploratórios evidenciaram alteração do bem-estar na dimensão física primordialmente, gerando situações de afrontamento que afetam a qualidade de vida.

Palavras-chave: Qualidade de vida, estomas cirúrgicos, acontecimentos que mudam a vida, gastroenteropatias.

Introducción

La ostomía digestiva es una abocadura del intestino a la pared abdominal realizada en una sala de cirugía. En adultos, las principales indicaciones de los estomas son el cáncer de colon y recto, traumas (lesiones por armas de fuego o cuchillos y accidentes automovilísticos) y enfermedades inflamatorias del intestino (colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn) (1).

Los estomas digestivas se encuentran entre los resultados finales para las personas con cáncer colorrectal. Este tipo de cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad a nivel mundial, constituyendo para el año 2015 un total de 774.000 defunciones (2). A nivel de Colombia, los reportes muestran que, en el año 2016, el 20 % de las causas de muerte se atribuyó al cáncer, siendo el de origen colorrectal una de las principales (3).

Las personas se ven obligadas a luchar contra el cáncer -que amenaza su vida- y deben someterse a una

cirugía invasiva para luego vivir con las consecuencias médicas y psicosociales durante algún tiempo o de manera permanente. En este sentido, la experiencia de someterse a una cirugía de estoma digestivo demanda el cumplimiento de las etapas quirúrgica, transoperatoria y posquirúrgica, en las cuales todas las personas necesitan contar con asistencia multidisciplinaria y con una preparación especial debido a los cambios a los cuales se ven enfrentadas (4). Por este motivo, es ideal que, desde el mismo momento de la demarcación del sitio del estoma, se indague por la red de apoyo con que cuenta la persona para ayudar a fortalecer los mecanismos de afrontamiento de su nueva condición de ostomizado, ya que, a partir de este momento, la presencia de la ostomía comprometerá no sólo los aspectos clínicos, sino también los aspectos emocionales, familiares y sociales de la vida diaria (5-7).

En consecuencia, las personas con ostomías digestivas se ven enfrentadas a múltiples cambios en sus prácticas rutinarias debido a la modificación en el modo de evacuación intestinal, fenómeno que afecta

notoriamente su calidad de vida (8-10). También son afectadas en sus roles y relaciones interpersonales; la imagen corporal puede verse distorsionada por alteración de su estado anímico y cambios en el humor generados por el afrontamiento de su nueva condición (11-12). Adicionalmente, la actividad física puede verse muy deteriorada por la presencia del estoma, dado que estas personas no pueden realizar los mismos movimientos que hacían antes de la cirugía y su limitación puede llegar, incluso, a dificultar la subida de las escaleras debido al temor de que se salga el contenido de la bolsa recolectora (13).

El personal de enfermería debe estar entrenado en el manejo de las personas ostomizadas, con el ánimo de brindar una asistencia humanizada y de calidad desde el periodo preoperatorio, facilitando la adaptación al nuevo estilo de vida de la persona portadora de ostomía (14-16).

Teniendo en cuenta este planteamiento, la presente revisión pretende indagar sobre el estado del arte acerca de la calidad de vida de las personas portadoras de ostomías digestivas, con el fin de identificar las características bibliométricas de las publicaciones recientes y otros aspectos temáticos de la calidad de vida relacionada con la salud de la persona.

Metodología

Revisión bibliométrica y exploratoria realizada en la base de datos de Scopus. La estrategia de búsqueda se llevó a cabo utilizando los descriptores: "Quality of life" AND "Surgical stomas". De este modo se obtuvo un total de 191 publicaciones seleccionadas por título, sobre las cuales se aplicaron los siguientes criterios de inclusión: artículos publicados a partir del año 2014, escritos en español y otros idiomas, artículos derivados de investigación y revisiones, escritos por enfermería exclusivamente o en cooperación con otras áreas de la salud, logrando una muestra total de 39 manuscritos que fueron analizados de acuerdo con criterios bibliométricos y según las temáticas abordadas en torno a la calidad de vida.

Los resultados bibliométricos se obtuvieron de la base de datos de Scopus, exportando los gráficos y

tablas obtenidas por año, autor, filiación institucional, fuente o revista, área de conocimiento, país y tipo de documento. Para identificar el nivel de evidencia, se clasificaron los artículos de acuerdo con el tipo de investigación y se ubicaron según escala de Jover y Navarro-Rubio (evidencia alta, media y baja) (17).

Para obtener los resultados exploratorios, se elaboró una matriz en software excel con un total de 35 artículos (se excluyeron 4 artículos: uno de ellos trataba estomas urológicas y el otro se refería a ostomías en el área de pediatría) en los que se identificaron los siguientes aspectos: cuestionarios de calidad de vida utilizados y dimensiones de la calidad de vida valoradas en dichos cuestionarios. Para los manuscritos que no precisaban cuestionarios, se identificaron las temáticas estudiadas en torno a la calidad de vida.

Análisis

Los resultados bibliométricos muestran que el número de publicaciones por año ha sido proporcional con un rango de 8 – 12 artículos en los últimos cinco años, excepto para el año 2018, donde se reportan 3 documentos publicados frente al tema de calidad de vida en personas adultas con ostomías digestivas. Los países con mayor número de publicaciones son el Reino Unido con el 35,9 %, seguido de Estados Unidos con el 20,5 %. Se encontró un total de 143 autores y coautores reportados en los artículos. El promedio de artículos por autor principal fue de 1 y los autores con mayor número de publicaciones son Herrle F, Inglese G, Kienle P y Post S, con dos publicaciones reportadas por cada uno. Con respecto a la afiliación institucional, se evidencia un mayor número de publicaciones reportadas por profesionales pertenecientes a universidades y a otras instituciones (centros médicos, laboratorios y empresas) con el 80,6 %, frente a un menor porcentaje de autores que representan a hospitales (19,5 %).

En cuanto al tipo de publicación, los artículos originales representan el 89,7 %; sin embargo, más de la mitad (66,7 %) corresponde a estudios de evidencia baja, siendo más representativos los estudios de tipo descriptivo y los estudios cualitativos (Tabla 1).

Tabla 1. Características bibliométricas de las publicaciones encontradas.

Variable Bibliométrica	f	%	
Número publicaciones por año	2014	7	21,2
	2015	8	24,2
	2016	12	24,2
	2017	9	27,3
	2018	3	3,0
País de Publicación	United Kingdom	14	35,9
	United States	8	20,5
	Sweden	3	7,7
	Turkey	3	7,7
	Denmark	2	5,1
	Germany	2	5,1
	Ireland	2	5,1
	Italy	2	5,1
	Undefined	2	5,1
	Australia	1	2,6
Afiliación Institucional de los autores y coautores	Universidades	35	45,5
	Hospitales	15	19,5
	Otros	27	35,1
Tipo de artículo	Original	35	89,7
	Revisión	4	10,3
Tipo de investigación	Descriptivo	22	56,4
	Cualitativo	5	12,8
	Correlacional	4	10,3
	Revisión Sistemática	4	10,3
	Ensayo Clínico AA	2	5,1
	Cohorte Prospectiva	1	2,6
	Cuasi-experimental	1	2,6
Nivel de Evidencia	Baja	26	66,7
	Media	11	28,2
	Alta	2	5,1

Fuente: Elaboración propia

Con relación a la fuente de publicación, se halló que los 39 artículos fueron publicados en 8 revistas extranjeras, de las cuales tres reportan el 61,5 % de las publicaciones (Ostomy Wound Management, Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing y British Journal of Nursing). Así mismo, se evidencia que todas las revistas se encuentran posicionadas en los cuartiles 1 y 2 del ranking internacional (Tabla 2). El promedio de citación por año fue de 35 citaciones, con un dato mínimo de 1 cita en el 2018 y un máximo

de 58 citas en el 2016. El promedio de citas por artículo fue de 5, con un dato mínimo de cero citas (en ocho artículos) y máximo de 20 (en dos artículos). El promedio de citación por autor fue de 914. El número mínimo de citas de un solo autor fue de cero y el máximo de 17.546. Con relación al índice H, se observa un dato mínimo de cero y máximo de 63, con un promedio de 10. El promedio de coautores por cada autor principal fue de 66.

Los resultados bibliométricos permiten identificar, en este caso, un diverso número de publicaciones que se encuentran ubicadas en revistas de alto impacto en el ranking internacional. El nivel de colaboración entre autores también es un aspecto que demuestra un significativo trabajo interdisciplinar entre los saberes de la medicina y enfermería para el cuidado de las personas ostomizadas. Sin embargo, la calidad de las publicaciones se ubica en nivel de evidencia baja de manera mayoritaria. Así mismo, en la base de datos consultada no se identificaron investigaciones publicadas por autores latinoamericanos. Al respecto, Sánchez et al. (18) ratifican cómo la aparición y desarrollo de sistemas de información basados en

grandes índices multidisciplinares como Web of Science y Scopus, han generado una evaluación bibliométrica, infométrica y cienciométrica que difícilmente permite que las revistas latinoamericanas sean elegidas para ser categorizadas y reconocidas por en estas bases bibliográficas.

Por otro lado, al evaluar los promedios de citación por autor, se puede decir que los datos son dispersos, razón por la cual se reportan citaciones extremas para algunos autores, con valores que van desde cero citas hasta aquellos por encima de las 10.000 citas para unos pocos autores.

Tabla 2. Características bibliométricas de las fuentes de publicación de los artículos encontrados

Revista	Nº Publicaciones	%	Indexación Internacional (2017)	H Índice	Factor de Impacto
Ostomy Wound Management	9	23,1	Q2	45	0,35
Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing	8	20,5	Q1	42	0,61
British Journal of Nursing	7	17,9	Q2	39	3,33
Gastrointestinal Nursing	4	10,3	Q2	12	0,25
Colorectal Disease	3	7,7	Q2	72	1,23
Techniques In Coloproctology	3	7,7	Q2	41	0,7
Diseases Of The Colon And Rectum	3	7,7	Q1	148	1,65
International Journal Of Colorectal Disease	2	5,1	Q2	76	1,05
Total	39	100			

Fuente: Elaboración propia

Los resultados exploratorios se describen con un total de 35 artículos, por lo que se excluyeron cuatro manuscritos que trataban el tema de ileostomías en pediatría y urostomías. En este sentido, de los artículos restantes se puede decir que, en el 31,4 % de ellos (11 estudios) se identificó la utilización de cuestionarios relacionados con la calidad de vida, mientras que en el 14,2 % (5 documentos) se trató la calidad de vida a través de estudios cualitativos y en el 54,2 % restante (19 documentos) se describen otros temas relacionados con las problemáticas de las personas ostomizadas, siendo explicadas en esta revisión como otros estudios que valoran aspectos que afectan la calidad de vida. En la Tabla 3 se presenta la descripción de los hallazgos encontrados.

Calidad de vida valorada en estudios cuantitativos mediante cuestionarios validados

Algunos de los estudios fueron realizados para medir

aspectos de la calidad de vida en poblaciones específicas de personas ostomizadas, mientras que en otros se explicaban las propiedades psicométricas y validaciones realizadas a estos cuestionarios. Los principales resultados mencionan, mayormente, alteraciones de la calidad de vida en la dimensión clínica y física. Se evidencian problemas relacionados con el estoma, incluido el relacionado con la privacidad para vaciar la bolsa, además de dificultades con fugas, necesidad de adaptar la ropa, irritación local de la piel, presencia de olor desagradable y/o ruidos intestinales. De igual forma, se ha demostrado una mayor adaptación física en las personas que presentan estoma permanente vs aquellas con estomas temporales, y mejor percepción de la salud general en aquellos ostomizados por traumatismos vs los ostomizados por procesos de cáncer (19). En otro estudio se muestra la relación entre la calidad de vida y el tipo de enterostomía, siendo me-

Claudia Liliana Valencia-Rico, Luz Adriana López-González, Laura Melissa Gómez-Suarez, Daniela Orrego-Murillo, Laura Vanessa Restrepo-Peláez

nor en personas con ileostomía temporal o en bucle (23). También se ha evidenciado que el estado de salud global y la calidad de vida auto-informada es menor en personas con alteración de la función ano-rectal después de la resección anterior baja del recto a causa del cáncer (29).

Tabla 3. Características identificadas en la calidad de vida de las personas ostomizadas que fueron descritas en las publicaciones.

Calidad de vida valorada en estudios cuantitativos mediante cuestionarios validados	Dimensiones o aspectos que valoran la calidad de vida	Referencias
Stoma Quality of life Scale (SQOLS):	Trabajo / Función social, Sexualidad / Imagen corporal y función del estoma.	(19)
Stoma Qol	Impacto físico y psicosocial.	(20, 21)
City of Hope Quality of Life Ostomy Questionnaire (COH-QOL-OQ)	Bienestar físico, Bienestar psicológico, Bienestar social y Bienestar espiritual.	(22, 23)
Ostomy-Q	Discreción, Confort, Confidencia y Relaciones Sociales.	(24)
Stoma Quality of Life (Stoma-QOL)	Sueño, Actividad sexual, Relaciones con familia y amigos cercanos, y Relaciones con los demás.	(25)
SF36v2 survey	Funcionamiento físico, Rol físico, Dolor corporal, Salud general, Vitalidad, Funcionamiento social, Rol emocional y Salud mental.	(26)
Questionnaire (EORTC QLQ-CR29):	Frecuencia urinaria, Infiltración fecal, Consistencia de las heces, Imagen del cuerpo.	(27)
Stoma Self-Efficacy Scale	Autoeficacia positiva frente al estoma	(27)
Chronic Health Conditions (ACHC) (Stoma) scale:	Aceptación y adaptación del estoma.	(27, 28)
EQ-5D-3L Protocol	Estado de salud auto-percibido con respecto a las actividades de la vida cotidiana.	(29)
Calidad de vida valorada en estudios cualitativos	Temas o Categorías encontrados	Referencias
Vivir con una hernia paraestomal: experiencias de los pacientes con los síntomas	- Hernia cambiante que requiere atención continua. - Sensaciones corporales desconocidas y desagradables. - Mi cuerpo se ve feo y deforme.	(30)
Experiencias del paciente después de la cirugía para revertir el estoma	- Vida controlada por la función intestinal alterada. - Esfuerzo por recuperar el control sobre el intestino. - El deseo de ser normal.	(31)
Perspectivas de los adolescentes después de la cirugía de ostomía	- El yo físico (realidad cambiante, aprendizaje y adaptación). - El yo social (reingreso y liberación).	(32)
Perspectivas del paciente frente a la tecnología de silicona en el cuidado del estoma	- Necesidades del paciente en cuidados de ostomía y características de la tecnología de silicona (adhesión instantánea, nivel de adhesión, higiene, mayor tiempo de uso, comodidad y menos desprendimiento).	(33)
Experiencias de los pacientes con el autocuidado del estoma en el postoperatorio inicial.	- Proceso de aceptación y el autocontrol del estoma. - Limitaciones físicas. - Reacciones psicológicas. - Apoyo social. - Necesidad de una preparación y educación oportunas.	(34)
Otros estudios que valoran aspectos que afectan la calidad de vida	Temas estudiados	Referencias
Tratamientos médico-quirúrgicos e intervenciones de enfermería para disminuir complicaciones de las colostomías.	- Hernias paraestomales, ubicación del estoma preoperatorio, complicaciones de la piel periestomal, cierre temprano del estoma, complicaciones tempranas del estoma, nuevas técnicas quirúrgicas para el estoma.	(35-44)
Dispositivos de barrera	- Rentabilidad, uso, evaluación a las enfermeras que atiende el estoma, tecnologías con silicona.	(45-48)
Aspectos psicológicos y sexualidad	- Atención psicosocial por las enfermeras que atienden el estoma, aspectos psicológicos generados por la presencia del estoma.	(49-51)
Estomas y religiosidad	- Efectos de los estomas en la fe islámica,	(7-52)

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, se han estudiado algunas intervenciones realizadas por enfermería, demostrando mejoras en la calidad de vida de los ostomizados. En una intervención basada en consejos para prevención de la hernia paraestomal y rutina de ejercicios, se observó mejora en la calidad de vida de los participantes que no desarrollaron hernia tras los cuidados ofrecidos en la intervención de enfermería. La recuperación principal se evidenció en la dimensión social y en la imagen corporal (21). Así mismo, en dos de los estudios se evaluó la relación entre la calidad de vida y el marcado del sitio del estoma preoperatorio en adultos con una ostomía permanente, encontrando una diferencia significativa en la calidad de vida para las personas marcadas por un cirujano o una enfermera vs otro profesional. Se comprueba, entonces, que la marcación preoperatoria del sitio del estoma es beneficiosa y debe realizarla una persona calificada para realizar el procedimiento. Adicionalmente se encontró una asociación significativa entre estar marcado por una enfermera antes de la operación, el tiempo transcurrido hasta que volvió el apetito del paciente y el tiempo avanzado hasta que dicho paciente se sintió cómodo con la dieta (22, 25).

En cuanto a las propiedades psicométricas de los cuestionarios de calidad de vida utilizados en las personas ostomizadas, se hallaron tres estudios de validación. En el primero de ellos se demuestra una consistencia interna para el cuestionario Stoma -Qol de 0.87. Su validez convergente, comparada con el cuestionario SF-12, confirmó una mayor correlación entre los elementos relacionados con aspectos emocionales, salud mental, aspectos sociales y vitalidad (20). En el segundo estudio se evaluó el Chronic Health Conditions (ACHC) (Stoma) Scale, cuya consistencia interna reportó un alfa de cronbach de 0,84 y un coeficiente intraclase de 0.997. El tercer estudio valoró las propiedades psicométricas del instrumento Ostomy-Q, encontrando una correlación intraclase mínimo de 0.743 ($p < .001$) (24). La validación de estos tres instrumentos demuestra una buena confiabilidad para ser utilizados en sus poblaciones de estudio. No se reportan validaciones actuales (de los últimos cinco años) de estos cuestionarios, en idioma español.

Calidad de vida valorada en estudios cualitativos

Con respecto al fenómeno de la calidad de vida valorado a través de la arista cualitativa, se encontraron cinco estudios cuyos temas emergentes se agrupan principalmente en las experiencias de la dimensión fi-

sica. En este sentido, las experiencias de vida relatan situaciones relacionadas con las alteraciones producidas por las hernias paraestomales -hernia cambiante que requiere atención continua, sensaciones corporales desconocidas y desagradables y cambios que alteran la imagen corporal- (30), la vida controlada por la función intestinal, el esfuerzo por recuperar el control sobre el intestino y el deseo de ser normal (31), además de los cambios ocurridos en el “yo físico” y el proceso de aceptación y autocontrol del estoma (33).

En menor proporción, los hallazgos describen la necesidad que tienen las personas de conocer los productos tecnológicos para cuidar de su estoma (33), las alteraciones en el rol social (32) y las reacciones psicológicas y necesidades de una preparación y educación oportunas (34). En los estudios cualitativos no se mencionan temas relacionados con la vida de pareja (relaciones sexuales) ni alteraciones en la funcionalidad familiar, problemáticas que hacen parte de la vida cotidiana en estas personas.

Los anteriores hallazgos ratifican la necesidad de adaptación de las personas ostomizadas en lo que respecta, en primera instancia, a la dimensión física, específicamente en lo que tiene que ver con la aceptación del estoma y todo lo relacionado con su autocuidado. Así mismo, se evidencia la necesidad de una educación y preparación preoperatoria más significativa, liderada por enfermería, que permita mejorar inicialmente la adaptación y posteriormente la calidad de vida.

Otros estudios que valoran aspectos que afectan la calidad de vida

Se encontraron 19 estudios en los que se menciona la afectación directa de la calidad de vida de las personas ostomizadas a causa de los tratamientos quirúrgicos e intervenciones de enfermería efectuados para disminuir las complicaciones de la ostomía (35-44), la necesidad de contar con profesionales de enfermería entrenados en el manejo de los dispositivos de barrera para garantizar una adecuada educación y entrenamiento en el cuidado de la ostomía (45-48), además de aspectos psicológicos, sexuales y religiosos relacionados con la presencia de la ostomía, los cuales generan alteración en el rol laboral y social, rechazo y problemas de exclusión en algunas poblaciones específicas, cuya cultura dificulta vivir en sociedad con un estoma digestivo (49-52).

Conclusiones

- Los resultados bibliométricos muestran gran cantidad de estudios de evidencia baja, predominando las investigaciones cuantitativas de tipo descriptivo y los estudios cualitativos. Todos los cuestionarios utilizados en las publicaciones para medir la calidad de vida son instrumentos validados en diferentes idiomas y culturas; en cada uno de ellos se intenta valorar las alteraciones de la calidad de vida relacionadas con la salud, desde las dimensiones físicas, emocionales, familiares y sociales, aunque algunos de ellos enfatizan más en aspectos físicos y en procesos de autoeficacia.
- Independientemente de cómo se haya valorado la calidad de vida o los factores que afectan la misma, en los resultados exploratorios se evidencian, de manera primordial, diversas alteraciones del bienestar en la dimensión física. El afrontamiento

y adaptación que debe realizar inicialmente la persona, se relaciona con la aceptación de su nueva condición corporal y funcional, su capacidad de autoeficacia y de autocuidado. De los cambios presentados a nivel físico se derivan situaciones de afrontamiento familiar y social que afectan la calidad de vida, ocasionados por el abrupto cambio en las actividades cotidianas que giran en torno a la presencia del estoma y de su funcionamiento.

- La limitante de este estudio radica en haber realizado búsquedas únicamente en revistas de Scopus, lo que podría ser poco representativo para quienes estudian el fenómeno de las ostomías en el ámbito nacional y local.

Conflicto de intereses

Las autoras declaran no tener ningún conflicto de intereses

Referencias Bibliográficas

1. Liu G, Chen Y, Luo J, Liu A, Tang X. The Application of a Moldable Skin Barrier in the Self-Care of Elderly Ostomy Patients. *Gastroenterol Nurs*. [Internet]. 2017 [Consultado noviembre 21 de 2018]; 40(2):117-20. Disponible en: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=26987102>
2. Organización Mundial de la Salud (OMS). Datos y cifras sobre el cáncer. [Internet]. 2018 [Consultado noviembre 21 de 2018]. Disponible en: <http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer>
3. Organización Mundial de la Salud (OMS). Mortalidad y carga de morbilidad. [Internet]. 2016 [Consultado noviembre 21 de 2018]. Disponible en: http://www.who.int/nmh/countries/col_en.pdf?ua=1
4. Martín Muñoz B, Crespillo Díaz AY. Information, a key element to re-establish self-esteem: the case of a recently ostomized person. *Index Enferm*. [Internet]. 2015 [Consultado 1 de diciembre de 2018]; 24(3): 169-73. Disponible en: <http://www.index-f.com/index-enfermeria/v24n3/sumario.php>
5. Su X, Qin F, Zhen L, Ye X, Kuang Y, et al. Self-efficacy and Associated Factors in Patients with Temporary Ostomies. *J Wound, Ostomy Continence Nurs*. [Internet]. 2016 [Consultado 1 de diciembre de 2018]; 43(6):623-29. Disponible en: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=27636323>
6. Su X, Zhen L, Zhu M, Kuang Y, Qin F, et al. Determinants of self-efficacy and quality of life in patients with temporary enterostomy: a cross-sectional survey. *J Clin Nurs*. [Internet]. 2017 [Consultado 1 de diciembre de 2018]; 26(3-4):477-84. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jocn.13469>
7. Iqbal F, Kujan O, Bowley DM, Keighley MRB, Vaizey CJ. Quality of life after Ostomy surgery in Muslim patients. *J Wound, Ostomy Continence Nurs*. [Internet]. 2016 [Consultado 1 de diciembre de 2018]; 43 (4): 385-91. Disponible en: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=27196687>
8. Dias T, Leite R, Barros A, Ximenes A, Freitas da S. Quality of life of people with intestinal stomas. *Acta Paul Enferm*. [Internet]. 2017 [Consultado 2 diciembre de 2018]; 30(2):144-51. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-21002017000200144&script=sci_arttext&tlng=en
9. Nichols T. Health-Related quality of life in community-dwelling persons with ostomies. *J Wound, Ostomy Continence Nurs*. [Internet]. 2015 [Consultado 2 de diciembre de 2018]; 42(4):374-377. Disponible en: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=26135823>

10. Lqbal F, Kujan O, Bowlwy D, Keighley M, Vaizey C. Quality of Life After Ostomy Surgery in Muslim Patients. *J Wound, Ostomy Continence Nurs.* [Internet]. 2016 [Consultado 2 diciembre del 2018]; 00(0):1-7. Disponible en: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=27196687>
11. Johnson D, Reading L, Ryan C. Analysing the role of support wear, clothing and accessories in maintaining ostomates' quality of life. *Gastrointestinal Nursing.* [Internet]. 2015 [Consultado 2 diciembre de 2018]; 13(7):23-35. Disponible en: <https://www.magonlineibrary.com/doi/abs/10.12968/gasn.2015.13.7.23>
12. Zhu X, Chen Y, Tang X, Chen Y, Liu Y, et al. Sexual Experiences of Chinese Patients Living with an Ostomy. *J Wound, Ostomy Continence Nurs.* [Internet]. 2017 [Consultado 2 diciembre de 2018]; 44(5): 469-474. Disponible en: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=28877113>
13. Nichols TR. Health-Related Quality of Life in Community-Dwelling Persons with Ostomies: The Physical Functioning Domain. *J Wound, Ostomy Continence Nurs.* [Internet]. 2015 [Consultado 3 diciembre de 2018]; 42(4): 374-77. Disponible en: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=26135823>
14. García Martínez C, García Cueto B. Cuidados de enfermería al paciente ostomizado. *Enfer Comunitaria.* [Internet]. 2017 [Consultado 3 diciembre de 2018]; 5(4):35-48. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6224482>
15. Neil N, Inglese G, Manson A, Townshend A. A cost-utility model of care for peristomal skin complications. *J Wound, Ostomy Continence Nurs.* [Internet]. 2016 [Consultado 3 diciembre de 2018]; 43(1):62-68. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4699471/>
16. Benício CDAV, de Carvalho NAR, De Sá Guimarães Noletto IR, Miranda SM, Luz MHBA. Conviviendo con una estoma húmedo: Un estudio acerca de la calidad de vida. *Cultura de los Cuidados.* [Internet]. 2016 [Consultado 3 diciembre de 2018]; 20(46):165-70. Disponible en: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/61758/1/CultCuid_46_16.pdf
17. Gálvez Toro A. Un enfoque crítico para la construcción de una enfermería basada en evidencia Invest. Educ. Enferm. [Internet]. 2003 [Consultado 1 de diciembre de 2018]; 21(1): 50-63. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1464621>
18. Sánchez Tarragó N, Santiago Bufrem L, Macedo dos Santos RN. La producción científica latinoamericana desde una mirada poscolonial. *Tend. Pesqui. Bras. Ciênc. Inf.* [Internet]. 2015 [Consultado 1 de diciembre de 2018]; 8(2): 182-202. Disponible en: <http://eprints.rclis.org/32986/>
19. Boraii S. A. Descriptive Study to Assess Quality of Life in Egyptian Patients With a Stoma Ostomy wound manage. [Internet]. 2017 [Consultado 3 diciembre de 2014]; 63(7):28-33. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28759426>
20. Livia de Oliveira A, Loures Mendes L, Pereira Netto M, Gonçalves Leite IC. Cross-cultural Adaptation and Validation of the Stoma Quality of Life Questionnaire for Patients With a Colostomy or Ileostomy in Brazil: A Cross-sectional Study Ostomy wound manage. [Internet]. 2017 [Consultado 3 diciembre de 2018]; 63(5):34-41. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28570247>
21. North J. Early intervention, parastomal hernia and quality of life: A research study. *Br J Nurs.* [Internet] 2014 [Consultado 3 diciembre de 2018]; 23(5):S14-S18. Disponible en: <https://doi.org/10.12968/bjon.2014.23.Sup5.S14>
22. Maydick D. A. Descriptive Study Assessing Quality of Life for Adults with a Permanent Ostomy and the Influence of Preoperative Stoma Site Marking. *Ostomy Wound Manage.* [Internet]. 2016 [Consultado 3 diciembre de 2018]; 62(5):14-24. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27192717>
23. Su X, Zhen L, Zhu M, Kuang Y, Qin F, Ye X, et al. Determinants of self-efficacy and quality of life in patients with temporary enterostomy: a cross-sectional survey. *J Clin Nurs.* [Internet]. 2017 [Consultado 4 diciembre 2018]; 26(3-4):477-84. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jocn.13469>
24. Nafees B, Rasmussen M, Lloyd A. The Ostomy-Q: Development and Psychometric Validation of an Instrument to Evaluate Outcomes Associated with Ostomy Appliances. *Ostomy Wound Manage.* [Internet]. 2017 [Consultado 3 diciembre de 2018]; 63(1):12-22. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28112646>

25. McKenna LS, Taggart E, Stoelting J, Kirkbride G, Forbes G.B. The impact of preoperative stoma marking on health-related quality of life: A comparison cohort study. *Journal Wound Ostomy Continence Nurs.* [Internet]. 2016 [Consultado 3 diciembre de 2018]; 43(1):57-61. Disponible: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=26727684>
26. Nichols TR. Quality of life in US residents with ostomies as assessed using the SF36v2. *Journal Wound Ostomy Continence Nurs.* [Internet]. 2015 [Consultado 4 diciembre 2018]; 42(1):71-8. Disponible en: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=26963024>
27. Lim SH, Chan SWC, Lai J.H, He HG. A randomized controlled trial examining the effectiveness of a STOMA psychosocial intervention programme on the outcomes of colorectal patients with a stoma: Study protocol. *J Adv Nurs.* [Internet]. 2015 [Consultado 4 diciembre 2018]; 71(6):1310-323. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jan.12595>
28. Lim SH, He HG, Chan S.W.C. Psychometric Properties of the Chinese Version of the Acceptance of Chronic Health Conditions (Stoma) Scale for Patients with Stoma. *Cancer Nurs.* [Internet]. 2017 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 40(4):E42-E49. Disponible en: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=27472188>
29. Gadan S, Floodeen H, Lindgren R, Matthiessen P. Does a Defunctioning Stoma Impair Anorectal Function After Low Anterior Resection of the Rectum for Cancer? A 12-Year Follow-up of a Randomized Multicenter Trial. *Dis Colon Rectum.* [Internet]. 2017 [Consultado 1 de diciembre de 2018]; 60(8):800-06. Disponible en: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=28682965>
30. Krogsgaard M, Thomsen T, Vinther A, Gögenur I, Kaldan G, Danielsen A.K. Living with a parastomal bulge-patients experiences of symptoms. *Journal Clin Nurs.* [Internet]. 2017 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 26(23-24):5072-081. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jocn.14009>
31. Reinwalds M, Blixter A, Carlsson E. A descriptive, qualitative study to assess patient experiences following stoma reversal after rectalcancer surgery. *Ostomy Wound Manage.* [Internet]. 2017 [Consultado diciembre 4 de 2018]; 63(12):29-37. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29324431>
32. Mohr LD, Hamilton RJ. Adolescent perspectives following ostomy surgery: A grounded theory study. *J Wound Ostomy Continence Nurs.* [Internet]. 2016 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 43(5):494-98. Disponible en: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=27488738>
33. Keeling N. Patient perspectives of silicone technology in stoma care. *Br J Nurs.* [Internet]. 2015 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 24:S20-S24. Disponible en: <https://doi.org/10.12968/bjon.2015.24.Sup5.S20>
34. Lim SH, Chan SWC, He HG. Patients' experiences of performing self-care of stomas in the initial postoperative period. *Cancer Nurs.* [Internet]. 2015 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 38(3):185-93. Disponible en: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=24836957>
35. Hayles K, Almoudaris A. Reducing the incidence of parastomal hernia with a simple surgical technique. *Br J Nurs.* [Internet]. 2017 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 26(5):S4-S10. Disponible en: <https://doi.org/10.12968/bjon.2017.26.5.S4>
36. Bland C, Young K. Nurse activity to prevent and support patients with a parastomal hernia. *Gastrointestinal Nursing.* [Internet]. 2015 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 13(10):16-24. Disponible en: <https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/gasn.2015.13.10.16>
37. Roveron G, De Toma G, Barbierato M. Italian society of surgery and association of stoma care nurses joint position statement on preoperative stoma siting. *J Wound Ostomy Continence Nurs.* [Internet]. 2016 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 43(2):165-69. Disponible en: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=26938165>
38. Neil N, Inglese G, Manson A, Townshend A. A cost-utility model of care for peristomal skin complications. *J Wound Ostomy Continence Nurs.* [Internet]. 2016 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 43(1):62-8. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4699471/>
39. Perez Merino R. Improving colorectal cancer patients' quality of life after stoma formation. *Gastrointestinal Nursing.* [Internet]. 2014 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 12(9):41-7. Disponible en:

<https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/gasn.2014.12.9.41>

40. Koc U, Karaman K, Gomceli I, Dalgic T, Ozer I, Ulas M, et al. A Retrospective Analysis of Factors Affecting Early Stoma Complications. *Ostomy Wound Manage.* [Internet]. 2017 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 63(1):28-32. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28112647>
41. Oliphant R, Czerniewski A, Robertson I, McNulty C, Waterston A, Macdonald A. The Effect of Adjuvant Chemotherapy on Stoma-Related Complications after Surgery for Colorectal Cancer: A Retrospective Analysis. *J Wound Ostomy Continence Nurs.* [Internet]. 2015 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 42(5):494-98. Disponible en: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=26336047>
42. Robertson JP, Puckett J, Vather R, Jaung R, Bissett I. Early Closure of Temporary Loop Ileostomies: A Systematic Review. *Ostomy Wound Manage.* [Internet]. 2015 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 61(5):50-7. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25965092>
43. d' Alessandro A, Kari N, Alameh A, Pasquier N, Tarhini A, Vinson Bonnet B, et al. Preliminary experience with umbilical stoma in transumbilical single-port colorectal surgery. *Tech Coloproctol.* [Internet]. 2018 [Consultado 1 diciembre del 2018]; 22(4):301-04. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29512046>
44. O'Leary DP, Carter M, Wijewardene D, Burton M, Waldron D, Condon E, et al. The effect of purse-string approximation versus linear approximation of ileostomy reversal wounds on morbidity rates and patient satisfaction: the 'Stoma' trial. *Tech Coloproctol.* [Internet]. 2017 [Consultado 1 diciembre del 2018]; 21(11):863-68. Disponible en: <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10151-017-1713-x>
45. Berger A, Inglese G, Skountrianos G, Karlsmark T, Oguz M. Cost-effectiveness of a Ceramide-Infused Skin Barrier Versus a Standard Barrier: Findings from a Long-Term Cost-effectiveness Analysis. *J Wound Ostomy Continence Nurs.* [Internet]. 2018 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 45(2):146-55. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5965922/>
46. Perrin A. Convex stoma appliances: An audit of stoma care nurses. *Br Nurs.* [Internet]. 2016 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 25(22):S10-S15. Disponible en: <https://doi.org/10.12968/bjon.2016.25.22.S10>
47. White M. Using silicone technology to maintain healthy skin in stoma care. *Br J Nurs.* [Internet]. 2014 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 23(22):1188-193. Disponible en: <https://doi.org/10.12968/bjon.2014.23.22.1188>
48. Stephen Haynes J. The outcomes of barrier protection in periwound skin and stoma care. *Br J Nurs.* [Internet]. 2014 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 23(5):S26-S30. Disponible en: <https://doi.org/10.12968/bjon.2014.23.Sup5.S26>
49. Di Gesaro A. The psychological aspects of having a stoma: A literature review. *Gastrointestinal Nursing.* [Internet]. 2016 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 14(2):38-44. Disponible en: <https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/gasn.2016.14.2.38>
50. Aktas D, Gocman Baykara Z. Body Image Perceptions of Persons with a Stoma and Their Partners: A Descriptive, Cross-sectional Study. *Ostomy Wound Manage.* [Internet]. 2015 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 61(5):26-40. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25965090>
51. Thyø A, Emmertsen KJ, Laurberg S. The Rectal Cancer Female Sexuality Score: Development and Validation of a Scoring System for Female Sexual Function After Rectal Cancer Surgery. *Dis Colon Rectum.* [Internet]. 2018 [Consultado 4 diciembre del 2018]; 61(6):656-66. Disponible en: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=29664801>
52. Akgül, B, Karadağ A. The effect of colostomy and ileostomy on acts of worship in the islamic faith. *J Wound Ostomy Continence Nurs.* [Internet]. 2016 [Consultado 4 diciembre de 2018]; 43(4):392-97. Disponible en: <https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=27196688>